

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ О КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта

Для проверки клинической эффективности препарата «Кармолис» капли были проведены клинические испытания в период с 1973 по 1977 гг. в больнице Daimler – Benz в Берне и Зальцбурге.

Цель исследования - изучение спазмолитических, ветрогонных и желчегонных свойств препарата «Кармолис капли». Исследования были проведены методом двойного слепого контроля. «Кармолис капли» разводились в растительном масле и помещались в мягкие капсулы. Количество активных компонентов на капсулу соответствовало их количеству, содержащемуся в рекомендованных 15 каплях. В качестве плацебо были использованы мягкие капсулы, содержащие чистое растительное масло. Лечение проходили 48 больных, страдающие желудочно-кишечными заболеваниями функционального характера с характерными симптомами: потеря аппетита, рвота, чувство несварения в кишечнике, отрыжка, секреторная недостаточность, метеоризм. Препарат и плацебо больные получали по 1 капсуле 3 раза в день после еды. Длительность лечения в среднем составила 2 недели. У 43 человек из 48-и было отмечено значительное улучшение общего состояния и уменьшение проявления симптомов. Фармакологическое действие капель «Кармолис» выразилось в спазмолитическом, желчегонном действии и снижении газообразования в кишечнике. Отличительный эффект на капли «Кармолис» наблюдался у 75% больных, в то время как на плацебо ответили лишь у 29% больных. Умеренный эффект был отмечен у 17% больных. У 8% больных препарат был неэффективен. Действие плацебо как умеренное или неэффективное оценили 71% больных. Статическая обработка показала, что различие между этими двумя методами лечения высоко достоверно ($p < 0.001$)/