

ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «КАРМОЛИС»

Включено 13 пациентов, досрочно выбыло 2. Пол: женщины –

11, мужчины - 2 Возраст: 60,3±10,3 лет Вес: 75,5±13,8кг.

Диагноз: деформирующий остеоартроз 9(69,2%).

Ревматоидный артрит - 4 (30,8%). Фоновая терапия: НПВП-12(92,3%)

Кортикостероиды - 3 (23,1%) Метотрексат - 3 (23,1%) Схема применения: наносить на область пораженного сустава 5 раз в сутки.

*Оценка боли (в мм) по визуальной аналоговой шкале*

	Исходно	7 день	14 день	21 день
В покое	40	27 p<0,01	18 (P<0,05)	12 (P<0,01)
В движении	67	54 (P>0,05)	38 (P<0,05)	27 (P<0,01)
При пальпации	60	48 (P<0,05)	36 (P<0,05)	20 (1X0,001)

*Припухлость максимально болезненного сустава или периартикулярных тканей*

	Исходно	7 день	14 день	21 день
Умеренно выражена	10(90,9%)	9 (81,8%)	5 (45,5%)	3 (27,3%)
Сильно выражена	1 (9,1%)	0	1(9,1%)	0
Отсутствует	0	2 (18,2%)	5 (45,4%)	8 (72,7%)

*Возможность снижения суточной дозы НПВП: Да-7, Нет – 3.*

*Быстрота всасывания после однократного нанесения -1 мин. 25 сек. Начало лечебного действия после однократного нанесения -13,23 мин. Продолжительность лечебного действия после однократного нанесения - 91,5 мин.*

Эффективность препарата по оценке больного:

*Очень хорошая - 3 (27,3%) Хорошая - 5 (45,4%),*

*Удовлетворительная - 3 (27,3%)*

Эффективность препарата по оценке врача:

*Хорошая - 8 (72,7%) Удовлетворительная - 3 (27,3%)*

Переносимость препарата по оценке больного:

*Очень хорошая - 3 (27,3%) Хорошая - 8 (72,7%)*

Переносимость препарата по оценке врача:

*Очень хорошая - 1 (9,1%) Хорошая-10 (90,9%)*

Побочных реакций не было.

*Зав. Кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета  
Саратовского ГМУ, профессор д.м.н.*

*А.П. Ребров*