

Отзыв о применении массажной жидкости "Кармолис" в ревматологическом отделении 4-ой ГКБ г. Иваново.

В период с сентября по октябрь 2003 года в отделении ревматологии на базе 4 ГКБ при лечении заболеваний суставов в комплексе с базисными препаратами и НПВП назначалась лосьон для наружного применения "Кармолис".

Жидкость "Кармолис" назначалась пациентам с ревматоидным артритом и полностеопартритом путем втирания 4-5 раз в день в пораженные суставы с последующим их укутыванием для достижения более выраженного эффекта.

Жидкость "Кармолис" применялась у 25 пациентов в возрасте от 21 до 75 лет, 15 из которых страдали ревматоидным артритом, а 10 – остеоартритом, длительность заболевания была от 3-х месяцев до 20 лет, все больные были с суставной формой заболевания, ревматоидный фактор был положительный у 10, отрицательный - у 5, активность процесса I ст. была у 6 пациентов, II ст. - у 7 и III ст. - у 2 пациентов, степень функциональной недостаточности суставов также была различной: ИФС 0 - 4 пациента, ИФС I - 8 пациентов, ИФС II - 3 пациента.

Продолжительность лечения всех пациентов составила 2 - 3 недели.

После применения жидкости "Кармолис" были получены следующие результаты.

Болезненность в суставах в покое в начале лечения наблюдалась у 17 пациентов, в конце - у 8, болезненность при движении в начале лечения испытывали все пациенты, а в конце лишь 9 человек.

Припухлость с повышением местной температуры в области суставов до лечения была у 5 пациентов, без повышения - у 10 пациентов, в конце лечения у всех пациентов было отмечено отсутствие повышения местной температуры и уменьшение отека периартикулярных тканей в среднем на 2 см.

Все пациенты с деформирующим остеоартрозом, имеющие в начале лечения реактивный синовит, были выписаны без признаков синовита.

Быстрота наступления анальгетического эффекта с точки зрения пациентов варьировала от 2-3 минут до 1 недели при регулярном применении препарата.

Повышение качества жизни и очень хорошую эффективность отметили 10 пациентов, хорошую - 7 пациентов, удовлетворительную - 6.

Эффективность препарата "Кармолис" лечащим врачом была оценена следующим образом: очень хорошая - у 12, хорошая у 8, удовлетворительная у 3-х. Уменьшить дозу НПВП удалось у 10 пациентов, полностью отменить у 5-х.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что назначение жидкости "Кармолис" в сочетании с терапией базисными препаратами и НПВП приводит к более быстрому и эффективному лечению больных, что в значительной степени повышает их качество жизни. Это позволяет рекомендовать использование "Кармолиса" для лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов.

Заведующая ревмоцентром, врач высшей категории

О.В. Лебедева

Заведующая кафедрой терапии ФПО

д.м.н., профессор СЕ. Мясоедова

