



**МАРФИНСКИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ**

“ 6 ” июля 2004 г.

№ 3842

141052, Московская область,  
Мытищинский район, п/о Марфино,  
ИНН 5029030328  
г. Москва  
ОКОНХ 97920, ОКПО 07855526  
Тел: 577-84-85

**ОТЧЕТ  
О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «КАРМОЛИС»  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА**

**ЦЕЛЬ РАБОТЫ:** Исследовать эффективность применения «Кармолиса» для лечения пациентов с заболеванием пародонта.

**ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

- Изучить влияние препарата «Кармолис» на клинические признаки воспаления при пародонтите.
- Провести сравнение эффективности аппликаций «Кармолиса» и общепринятых травяных аппликаций.

Для выяснения влияния препарата «Кармолис» на клиническое лечение пародонтита было обследовано 20 пациентов с хроническим пародонтитом в средней тяжести в стадии обострения. Все больные были разделены на две группы:

**I. группа – основная (10 пациентов), которым применяли аппликации «Кармолиса» в разведении 1:100 после первого этапа лечения (снятие над и поддесневых зубных отложений, промывание карманов хлоргексидином);**

**II. группа – контрольная (10 пациентов), которым накладывали травяные аппликации после первого этапа лечения.**

***Обследование больных включало:***

1. Общеклиническое стоматологическое.
2. Проба Шиллера-Писарева для оценки воспалительного процесса в десне. Определяли цифровое значение (число Свракова) в баллах: слабо –

выраженное до 2,3 балла; умеренное – 2,67 – 5,0 баллов; интенсивное – 5,3 – 8,0 баллов.

### 3. Определение степени кровоточивости и болезненности.

Все исследования проходили до, после 5 – 6 процедур и после курса лечения (после 10 процедур).

**Результаты:** При клиническом обследовании большинство пациентов предъявляли жалобы на болевые ощущения и кровоточивость десен, дискомфорт в полости рта. При осмотре полости рта у всех больных были выявлены – болезненность, отек и гиперемия слизистой оболочки. Проба Шиллера - Писарева составила 5,1 в обеих группах.

После 5 – 6 процедур было отмечено умеренно выраженное уменьшение клинических признаков воспаления у всех пациентов. Проба Шиллера – Писарева составила 4,1 в опытных и 4,2 в контрольных группах, болезненность в опытной группе уменьшилась вдвое по сравнению с контрольной.

После курса лечения значительное снижение воспалительного процесса отмечено в обеих группах. Проба Шиллера – Писарева составила 3,0 в основной группе и 3,1 в контрольной.

### **ВЫВОДЫ:**

1. Препарат «Кармолис», применяемый в виде аппликации на десне и пародонтальные карманы, способствует уменьшению воспалительного процесса при пародонтите.
2. Препарат «Кармолис» оказывает более выраженное обезболивающее действие, чем обычно применяемые травяные аппликации.

**НАЧАЛЬНИК МАРФИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ВОЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ**  
полковник медицинской службы Э. МАЕВ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МАРФИНСКОГО  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО  
САНАТОРИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ**  
подполковник медицинской службы Б. ЕМЕЛЬЯНОВ

**ВЕДУЩИЙ ТЕРАПЕВТ МАРФИНСКОГО  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО  
САНАТОРИЯ**  
подполковник медицинской службы А. КРАСНОВ

**ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ  
КАБИНЕТОМ МАРФИНСКОГО ЦВКС Л. ГИМАЕВА**